

## 栽培暦

カンゾウの栽培暦(独立行政法人医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部)

月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
生																																				
育																																				
相																																				
と																																				
作																																				
業																																				
目																																				
以																																				
降																																				
作	☆基肥(10a): 堆肥: 500~1000kg 苦土石灰: 60~100kg						☆追肥(10a): 2年目4月中~下旬(寒冷地 5月上~中旬) 苦土石灰: 60~100kg 窒素: 6~8kg 磷酸: 5~7kg 加里: 8~12kg						☆病虫害: ☆病虫害: 生育期間を通じハダニやアブラムシの発生がみられるが、寒冷地では顕著な病害はない。						☆収量: ウラルカンゾウ実生3年生株のストロン、根における乾物収量はそれぞれ、300~500kg、300~400kg(10a)。																	
業	☆播種: 株間10~20cm, 畝幅60cm 量 400~500g(10a)						☆ストロンの定植: 株間20~50cm, 畝幅60cm 長さ 10~20cm 3333~8333本(10a)						☆収穫・調製: 播種または定植後3年目以降の11月頃(寒冷地では9月下旬~10月上旬)、地上部を刈り取り、デガーで根とストロンを収穫。水洗後、根とストロンに分けて速やかに乾燥させる。																							
の																																				
内																																				
容																																				