

ホソバオケラ栽培暦(北海道)

| 月 旬 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11~3 | | |
|----------------|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------|---|---|---|---|----|------|-------|------|-------------|----|
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | | | |
| 生育 相と 作業 | 一年目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | △株分け | △植え付け | 降雪 | 休眠 | |
| | 二年目 | | 終雪 | | ○—○ 萌芽 | | | | | | | | | ○—→ 根茎肥大 | | | | | | | | | 降雪 | 休眠 |
| | 三年目 | | 終雪 | | ○—○ 萌芽 | | | | | | | | | ○—→ 着蕾・根茎肥大 | | | | | | | | | 降雪 | 休眠 |
| | 四年目 | | 終雪 | | ○—○ 萌芽 | | | | | | | | | ○—→ 着蕾・根茎肥大 | | | | | | | | | ○—○→ 収穫期 | |
| 作業 の 内容 | ☆株分け 種イモ重は30~60g | | | | | | | | | | | | ☆防除 1) アブラムシ 生育期全般 2) 白絹病 梅雨明け | | | | | | | | | | | |
| | ☆植え付け 栽植密度は5,500株(10a当たり) 条間60cm×株間30cm | | | | | | | | | | | | ☆除草 6月から9月にかけて適宜除草する。 9月の除草は越年雑草が対象。 | | | | | | | | | | | |
| | ☆施肥 基肥 堆肥2,000~3,000kg(10a当たり) 追肥(kg/10a) | | | | | | | | | | | | ☆収穫 植え付け4年目 | | | | | | | | | | | |
| | 2年目 春 なし 夏 窒素 4 3 加里 4 3年目 春 窒素 5.5 4 加里 6 夏 窒素 5.5 4 加里 6 4年目 春 窒素 6 9 加里 7 夏 窒素 6 加里 7 | | | | | | | | | | | | ☆調製 掘り取った根茎を水洗する。 適当な大きさに切断し、乾燥。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ☆収量 10a当たり1,000~1,500kg(乾燥重) | | | | | | | | | | | | |