

ミシマサイコ栽培暦

月	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
生育相と作業																																				
作業の内容	<p>☆基肥 (10a当り)</p> <p>堆肥：1,000～2,000kg</p> <p>鶏糞：100～150kg</p> <p>菜種油粕：50～100kg</p> <p>化成肥料(15-15-15)：20kg</p>									<p>☆病虫害防除</p> <p>炭そ病：梅雨期，秋雨期</p> <p>根朽病：収穫期</p> <p>アブラムシ：生育期全般</p>									<p>☆摘芯 (着蕾期)</p> <p>地上部が繁茂した時</p> <p>地上50～70cmで切除</p> <p>摘芯期間中に2～3回実施</p>																	
作業の内容	<p>☆種子予措</p> <p>流水24時間浸漬</p>									<p>☆追肥 (年2回)</p> <p>1回目 (6/中～下)</p> <p>化成肥料(15-15-15)：40～50kg</p> <p>鶏糞：100～150kg</p>									<p>☆収穫</p> <p>降霜後，地上部が枯死した時期に行う。</p> <p>地上部を5cm程度残して刈り取り，掘り起こす。</p> <p>根は良く水洗いし，土砂を落とす。</p>																	
作業の内容	<p>☆播種量 (10a当り)</p> <p>800～1,000g</p>									<p>2回目 (9/上)</p> <p>化成肥料：1回目の同量～半量</p>									<p>☆調製</p> <p>洗浄した根が半乾燥の時に，ヒゲ根を取り除く。</p> <p>地上部を地際から切り落とす。</p> <p>形を整える。</p> <p>水分含量10%程度まで乾燥する。</p>																	
作業の内容	<p>☆播種</p> <p>条間60～70cmに条播</p>																		<p>☆収量</p> <p>10a当り：30～50kg</p>																	
作業の内容	<p>☆間引き (2～3葉期)</p> <p>株間5cm間隔 (千鳥状)</p>																		<p>☆採種</p> <p>2年生株から種子を採る。</p>																	